

# Coléoptères de l'Oubanghi, recueillis par Crampel

Par L. FAIRMAIRE.

Séance du 11 avril 1893.

Le souvenir de l'Expédition Crampel, si malheureusement terminée, est encore trop vibrant dans nos mémoires pour que notre Société ne s'intéresse pas à un témoignage entomologique de ce vaillant et regretté pionnier de nos colonisations africaines. Grâce à l'obligeance de notre collègue M. A. Lamey, parent de Crampel, j'ai eu en communication une petite collection de Coléoptères récoltés dans la région de l'Oubanghi, dernier envoi adressé par Crampel à sa famille et dernière preuve de son intérêt pour l'histoire naturelle.

J'en présente le résumé à la Société, et ces quelques pages conserveront, dans nos *Annales*, le souvenir de l'intrépide explorateur qui a montré la route du Tchad à ses successeurs.

<i>Cicindela nilotica</i> Dej.	<i>Oniticellus planatus</i> Cast.
<i>C. id.</i> , var. <i>caeruleus</i> Fairm.	<i>Trochilus rotundatus</i> Cast.
<i>C. Strachani</i> Hope.	BILGA PICTIPENNIS, n. g. et n. sp.
<i>C. interstincta</i> Sch.	<i>Adoretus hirtellus</i> Cast.
<i>C. melancholica</i> Fab.	DIMYXUS CRAMPELI, n. g. et n. sp.
<i>Ophryoderes rufomarginata</i> Boh.	<i>Cyphonistes bicornis</i> , n. sp.
<i>Pheropsophus angolensis</i> Chand.	<i>C. FISSICOLLIS</i> , n. sp.
<i>Morio guineensis</i> Imh.	<i>Goliathus giganteus</i> Lam.
<i>Tefflus Megerlei</i> Fab.	<i>Chelorchina Polyphemus</i> Fab.
<i>T. Jamesoni</i> Bates.	<i>C. Savagei</i> Harr.
<i>Homoderes Mellyi</i> Parry.	<i>C. torquata</i> Drury.
<i>Alindriu elongata</i> Guér.	<i>Eudicella Morgani</i> White.
<i>Metopodontus Savagei</i> Hope.	<i>E. Grillii</i> Buq.
<i>Nigidius Mniszechi</i> Th.	<i>Ceratorchina micans</i> Drury.
<i>N. auriculatus</i> Guér.	<i>C. ruficeps</i> Kolbe.
<i>Anachalcos cupreus</i> .	<i>C. guttata</i> Ol.
<i>Heliocpris Pirmal</i> Fab. ♀.	<i>C. Harrisii</i> Westw.
<i>Onitis SPINICRUS</i> , n. sp.	<i>Tuesorchina PRASINELLA</i> , n. sp.
<i>Gnathopagus Semiris</i> Th.	<i>Gnathocera SUBMARGINATA</i> , n. sp.

- Plesiorhina mediuna* Westw.  
*P. trivittata* Schaum.  
*Smaragdesthes mutica* Har.  
*Euryomia sanguinolenta* Fab.  
*Pachnoda Poggei* Har.  
*P. tridentata* Ol.  
*P. ornata* Fab.  
*P. Nachtigali* Kr.  
*Diplognatha gagates*.  
*D.* CRAMPÉLI, n. sp.  
*Eriulis variolosa* C. G.  
*Myoderma alutaceu* Afz.  
*M.* DICHIROA, n. sp.  
*Valgus ALBIVENTRIS*, n. sp.  
*Sternocera Iris* Har.  
*Chrysaspis elongata* Ol.  
*Evides intermedia* Saund. — Décrit  
de Mozambique.  
*Chalcophora chrysochlora* Palis.-  
Beauv.  
*Melybæus MULTICOLOR*, n. sp.  
*Apate monacha* Ol.  
*Aputraui segre* Th.  
*Toxicum taurus* Fab.  
*Nyctobates BLAPOIDES*, n. sp.  
*Taraxides punctatus* Fab.  
*Odontopus regalis* Har.  
*Metallonotus denticollis* Gray.  
*Prioscelides rugosus* Kolbe.  
*Heteroscelis passaloides* Westw.  
*Megarantha dentata* Fab.  
*Hoplonyx monophthalmus* Th.  
*Strougylium variolosum* Duv.  
*Praoyena nigratarsis* Mëkl.  
*P. rubripes* Cast.  
*Lagria analis* Th.
- L. SUBCOSTULATA*, n. sp.  
*Eletica colorata* Har.  
*Mylabris bifasciata* Ol.  
*M.* Afzeli.  
*Ceroctes interna* Har.  
*Ommatomenus megalops* White.  
*Mallodon Downesi* Hope.  
*Macrotoma pulmata* Fab.  
*M. natala* Th.  
*Sobarus Poggei* Har.  
*Ancylonotus tribulus* Fab.  
*Ceroplesis quinquefasciata* Fab.  
*C. bicincta* Fab.  
*C. arcuata* Har.  
*Diastocera trifasciata* Fab.  
*Sternotomis virescens* Westw.  
*S. variabilis* Qued.  
*S. imperialis* Fab.  
*S. irrorata* Ol.  
*Trugocephala Buqueti* Chevr.  
*T. FUSCOVELUTINA*, n. sp.  
*Mecha Hecale* Chevr.  
*Coptops ædificator* Fab.  
*Gnathonia albomaculata* Qued.  
*Eurytops Esau* Chevr.  
*Lophoptera asperula* White.  
*Rhynchophorus phanicis* Fab.  
*Sipalus guineensis* Imh.  
*Rhina Afzeli* Fahr.  
*Colasposoma laticorne* Th.  
*Corynodes discretus* Lef.  
*Pachetoma nigripes* Ol.  
*Episcapha caeca* Fab.  
*Hyperacantha FLAVODORSATA*, n. sp.  
*H. PECTORALIS*, n. sp.  
*Monolepta ATOMARIA*, n. sp.

*CICINDELA NILOTICA* Dej. — Cette espèce est répandue depuis l'Égypte jusqu'au Sénégal et se retrouve dans la région de l'Oubanghi, où elle présente, avec le type, une variété assez curieuse en ce que les fascies pâles, convexes, sont devenues brunes, et les fascies bronzées, déprimées, sont d'un bleu clair; la bordure marginale et apicale conservant la coloration typique.

**Onitis spinicrus**, n. sp. — Long. 16 à 20 mill. — *Obscure xeneovirescens, nitidus, oblongo-quadratus; capite antice rotundato, subtiliter rugoso, clypeo medio tuberculo paulo transverso signato, carina frontali interrupta, summo medio obtuse tuberculato; prothorace sat grosse punctato, antice leviore, vitta media antica lavi, basi bifoveata; scutello mediocri; elytris parum fortiter striatis, striis subtiliter punctatis, basi latioribus et fortius punctatis; intervallis fere planis, levibus, lateribus acute carinatis et intus longitudinaliter impressis; ♂ femoribus anticis dente brevi obtuso armatis, tibiis elongatis, apice arcuatis, intus 4 dentatis, femoribus posticis dente valido, acuto, recto, armatis; ♀ minor, clypeo transversim breviter carinato, tuberculo frontali magis prominente, femoribus inermibus.*

Paraît voisin de *O. van der Kelleni* Lansb., mais plus petit, le corselet plus grossièrement ponctué, le chaperon n'ayant qu'un tubercule chez le mâle, les élytres à stries finement ponctuées, les bords non crénelés, les fémurs antérieurs n'ayant qu'une petite dent obtuse, les postérieurs armés d'une dent droite, forte et aiguë. L'écusson n'est pas très petit.

### **Bilga**, n. g.

Ce nouveau genre est très voisin des *Trochilus* et des *Omaloptia*; il en diffère par le métasternum qui forme une forte saillie en avant, comme chez les *Antichira* et les *Spilota*; les antennes paraissent n'avoir que neuf articles, dont quatre pour la massue, qui est plus longue que le funicule; les branches postérieures sont très grandes, les pattes sont comprimées, les tibias antérieurs sont faiblement bidentés et les crochets tarsiens sont fortement appendiculés. La sculpture des élytres est assez curieuse pour ce groupe.

**B. pictipennis**, n. g. — Long. 9 mill. — *Ovata, convexa, fusca, vix nitidula, leviter ceruleo-nicans, elytris maculis oratis rufo-testaceis, a maculis nigro-velutinis separatis, ornatis; capite antice leviter attenuato, opaco, clypeo nitido, punctulato, apice sinuato et paulo reflexo; antennis dilute piceis; prothorace sat brevi, antice valde attenuato, dorso fuliginoso-variegato, margine postico anguste carulescente, utrinque sinuato; scutello sat lato, triangulari, apice obtuse acuminato; elytris oratis,*

*sutura et utrinque costis 4 sat lalis, marginali duplici, interstitiis maculatis, 3<sup>o</sup> angustiore et minus maculato, costis basi et humeris rufotestaceo-maculatis; pygidio sat dense punctato; subtus cum pedibus fusco-cærulescens, subopaca, punctulata.*

Ressemble un peu à *Omalopecta irrorata*, de Madagascar, mais la forme du métasternum et la sculpture des élytres sont fort différentes.

1. **Cyphonistes bicornis**, n. sp. — Long. 3½ mill. — *Oblongo-ovatus, postice paulo ampliatus, convexus, fuscus, nitidus; capite lævi, clypeo antice fortiter bidentato, medio cornu valido, leviter arcuato, apice furcato, armato; prothorace transverso, antice angustato, lateribus medio fere angulatim rotundatis, fortiter marginalis, dorso lævi, antice cornu sat elongato, leviter arcuato, antice paulo oblique protenso, armato, basi sat fortiter marginato et utrinque late sinuato; scutello sat acute ogivali, basi punctato; elytris postice leviter ampliatis, dorso subtiliter punctatis, basi paulo evidentius, lineis geminatis hand distinctis, stria suturali basi tantum impressa; pygidio convexo, basi et lateribus sat dense punctulato; pectore subtiliter coriaceo, dense rufo-villoso; abdomine lævi; pedibus validis, tibiis anticis fortiter et acute tridentatis, tarsis crassis, articulo 4<sup>o</sup> dilatato, angulato, 5<sup>o</sup> difformi, inflato, intus emarginato et piloso, angulato, unguiculo interno magno, crasso, arcuato, altero gracili, minore.*

Se rapproche de *C. vallatus* pour l'armature de la tête qui, combinée avec celle du corselet, rappelle plutôt celle de *Xylotropes Gedeon*. Ce *Cyphonistes* est remarquable aussi par son corselet lisse et ses élytres à peine ponctuées.

2. **C. fissicollis**, n. sp. — Long. 29 mill. — *Oblongo-ovatus, valde convexus, nigro-fuscus, nitidus; capite breviter triangulari, rugatulo, antice angustato, utrinque leviter sinuato et angulato, apice breviter obtuse producto et recurvo, fronte medio obsolete bituberculato; prothorace sat amplo, antice angustato, lateribus a basi rotundatis, dorso lævi, medio late et profunde canaliculato, antice sat declivi, late impresso, plicatulo-coriaceo, margine antico medio tuberculo brevi conico armato, lateribus punctatis, margine postico recto, intus sulco punctato, utrinque latiore comitato; scutello ogivali, lævi; elytris sat brevibus, ad humeros sat angulatis apice rotundatis, dorso geminatim punctato-lineatis, intervallis similiter punctatis, punctis basi sat grossis, postice obsolescentibus, intervallis basin versus paulo plicatulis, parte marginali et apicali densius punctata, linea suturali striata; pygidio brevi, dense punctato-rugoso; pectore lateribus dense rugosulo-punctato et rufo-villoso, metasterno medio lævi et sulcatulo, prosterno apice truncato et fulvo-ciliato, seg-*

*mentis abdominalibus linea punctata transversim impressis; pedibus validis, tibiis auticis quadridentatis, dente supero breviter angulato, cæteris validis, tarsis sat gracilibus, anterioribus articulo ultimo et unguibus simplicibus; ♀.*

Ressemble à *C. rullatus*, mais sans armature à la tête et au corselet, ce dernier fortement canaliculé au milieu.

### **Dimyxus, n. g.**

Ce nouveau genre de Scarabéides est remarquable par sa taille, son corps massif, son corselet dilaté sur les côtés, armé au milieu d'une saillie fortement comprimée, assez courte, presque tronquée et surtout par sa tête munie d'une longue corne arquée, dépassant presque le bord postérieur du corselet avec le chaperon profondément échancré, formant deux lobes comprimés, concaves en dessus, garnis en dedans et en dehors d'une villosité rousse extrêmement serrée, les mandibules formant en dessous une plaque relevée, arrondie en dedans, entière sur les bords; le menton est assez convexe, déclive en avant; toute la bouche est garnie de poils roux serrés; le dernier article des palpes est oblong, un peu ovalaire; les antennes sont épaisses, la massue de trois articles très serrés. Le prosternum forme, derrière les hanches, une forte saillie verticale terminée par un touffe de poils roux. Le corselet a les côtés dilatés et aplanis en avant. Les pattes sont assez courtes, très robustes, les tibias antérieurs armés de dents très fortes, les autres ont deux rangées de spinules et sont terminés par des digitations larges, acuminées; les tarses sont robustes, le premier article des postérieurs est fortement prolongé à l'angle externe.

Ce genre est voisin des *Oryctes*, mais s'en distingue facilement par la conformation de la tête et du corselet.

**D. Crampeli, n. sp.** — Long. 60 mill. — *Subquadrato-oratus, convexus, fuscus, nitidus; capite mediocri dense punctato, corvæ basi similiter punctato, apice multo subtilius; prothorace longitudine dimidio latiore, antice et lateribus dense coriaceo, basi subtiliter parce punctato, lateribus antice dilatatis, paulo reflexis, fere angulatim rotundatis, medio leviter sinuatis, angulis posticis sat rotundatis; scutello triangulatri, carioso-punctato, medio carinulato; elytris fortiter sat dense ocellato-punctatis, punctis parum profundis, stria suturali densissime punctata, utrinque lineis 3 geminatis, punctatis, carina submarginali paulo crenulata ab humero fere ad apicem prolongata; pygidio valde convexo, basin et apice dense aspero-punctato et rufo-villosulo, medio parce punctato; subtus fere lævis, pectore lateribus punctatis, segmentis ventralibus transversim punctatis.*

Ce bel Insecte est remarquable par la conformation de la tête et du corselet. Son nom rappellera celui de l'infortuné Crampel, qui l'a découvert sur les bords de l'Oubanghi.

**Tmesorhina prasinella**, n. sp. — Long. 10 à 12 mill. — *Ovato-oblonga, postice attenuata, parum convexa, tota viridis, nitidissima, lateribus nitidioribus, tarsis piceis; capite luce punctato, medio longitudinaliter convexiusculo, clypeo apice late leviter sinuato, angulis sat rotundatis; prothorace transverso, a basi arcuatim angustato, dorso sat fortiter luce punctato, medio fere lævi, lateribus anguste marginalis, sulco marginali profundo, dense punctato, ante basin abbreviato, margine postico medio late sinuato, utrinque fere recto, angulis fere rotundatis; scutello triangulari, acuto, utrinque luce punctato; elytris a basi attenuatis, apice extus rotundatis, angulo suturali acutiusculo, dorso lineato-punctatis, lateribus post medium transversim strigosulis, sutura postice elevata; pygidio strigosulo-asperato; subtus medio lævis, lateribus fortiter parum dense punctata, punctis fuscis, processu mesosternali lato, plano, apice rotundato, femoribus strigosis, tibiis anticis ante apicem extus sinuatis, apice tantum spinosis, posterioribus intus ciliatis.*

Ressemble tout à fait à *T. Iris*; n'en diffère que par les pattes de la même couleur que le corps et les tibias antérieurs non dentés avant l'extrémité, mais légèrement sinués, ce qui détermine au-dessus une faible angulation extrêmement effacée; le bord antérieur du chaperon est peut-être un peu plus sinué.

**Gnathocera submarginata**, n. sp. — Long. 17 mill. — *Oblongovata, postice paulo attenuata, parum convexa, castanea, nitida, capite obscuriori, elytris flavo-testaceis, margine laterali dilute castaneo, subtus cum pedibus dilutius castaneu; capite antice angustato, dense strigoso-punctato, summo lævi, clypeo lateribus carinato et antice utrinque dente acute prolongato, compresso, apice truncato, armato; prothorace transverso, antice tantum angustato, dorso fortiter parum dense punctato, postice medio lævi, basi medio sat fortiter sinuato, angulis posticis sat rotundatis; scutello acuto, medio longitudinaliter impresso; elytris apice angustatis, sutura et utrinque costulis 2 parum elevatis, linea punctata utrinque comitatis, interstitiis grosse et irregulariter punctatis, basi convexis et lævibus, parte laterali subtilius dense punctata, angulo suturali acute producto; pygidio subtilissime dense strigosulo; subtus parce punctata, pectore paulo densius, tibiis anticis tridentatis.*

Voisine de *G. Afzelii*, mais d'une coloration plus claire; les élytres, moins convexes, n'ont qu'une faible teinte marron le long des bords latéraux, qui sont plus finement et plus densément ponctués, mais non

striolés vers l'extrémité; la tête est bien plus fortement ponctuée-striolée; il n'y a pas de bande suturale.

**Diplognatha Crampeli**, n. sp. — Long. 25 mill. — *Ovata, parum convexa, tota æneo-viridis, metallica, nitida, subtus paulo nitidior, metasterno leviter cupreo-tincto; capite subquadrato, subtiliter punctato, lateribus sat fortiter marginatis, antice late sinuato, angulis haud acutis, antennis fuscis; prothorace parum transverso, elytris paulo angustiore, antice angustato, lateribus leviter marginatis, dorso impunctato, basi late rotundato, ad scutellum vix sensim sinuato, angulis rotundatis; scutello elongato, acuto, lævi; elytris postice attenuatis, ad suturam fere lævibus, lateribus et apice densissime subtiliter strigosulis, callo postico prominente, humeris leviter oblique impressis, sutura postice paulo elevata, angulo suturali obtuso; pygidio subtiliter dense coriaceo; subtus lateribus dense subtiliter coriaceo-punctata, medio lævissima, metasterno late planato, fere pentagono, antice obtuse producto, abdomine medio lævi, lateribus punctatis et extus coriaceis, tibiis anticis acute tridentatis.*

Ressemble pour la forme à *D. gagates*, mais plus large; en diffère, outre la coloration, par le chaperon plus sinué, le corselet entièrement lisse, à peine distinctement sinué à l'écusson, et par les élytres finement coriacées en dehors, avec l'angle sutural un peu saillant mais obtus.

*D. subænea* Duviv. paraît se rapprocher de cette espèce, mais elle est plus grande, d'un bronzé obscur faiblement cuivreux, le chaperon a les angles antérieurs aigus et relevés, le corselet est pointillé sur le disque et linement chagriné sur les côtés.

**Myoderma dichroa**, n. sp. — Long. 17 mill. — *Ovata, convexa, fusca, sat nitida, capite (vertice et marginibus exceptis), prothorace et pygidio ochraceo-rufis; capite dense punctato, lateribus antice paulo reflexis, margine antico medio elevato-lobato, lobo apice fere truncato, basi intus breviter carinato, clypeo utrinque depresso, angulis rotundatis, antennis et ore piceo-rufis; prothorace transverso, elytris paulo angustiore, antice angustato, lateribus antice cum angulis et margine antico fortiter rotundato, dorso densissime punctato, medio obsolete lineato, lateribus medio macula obscura signato, margine postico vix bisinuato, anguste infuscato, angulis parum obtusis; scutello ogivali, sat lato, dense punctato; elytris ad humeros sat angulatis, medio paulo ampliatis, dorso densissime subtiliter punctulatis, sutura et utrinque costis 3 late convexis, interstitiis longitudinaliter leviter elevatis, lateribus pone humeros paulo impressis; pygidio subtiliter densissime punctato;*

*subtus dense subtiliter granulato, pectore rufo-villoso, pedibus sat fortiter asperulis, tibiis anticis tridentatis.*

Cette belle espèce est remarquable par sa coloration, son corselet à angles postérieurs presque obtus, son chaperon relevé au milieu en un lobe court, fortement arrondi au sommet, et par ses élytres à larges côtes.

**Valgus albiventris**, n. sp. — Long. 40 mill. — *Oratus, crassus, elytris planatis, subtus valde convexus et densissime pallido-squamosulus, supra velutinus, rubiginoso-castaneus, lateribus dilatioribus, tuberculis setosis et fasciis elevatis brunneis, propygidio lateribus rufo, medio macula lunata pallide squamosa et utrinque penicillata, pygidio dense pallido-squamoso; capite obscuro-rufo velutino, clypeo rugosulo, utrinque longe rufo-penicillato; prothorace elytris angustiore, antice a medio sat fortiter angustato, dorso valde inæquali, antice dentibus 2 denudatis brevibus protensis, ante medio tuberculis 2 discoidalibus dense rufo-setosis et utrinque denticulo minuto denudato, postice utrinque tuberculis 2 majoribus, dense rufo-setosis; elytris brevibus, basi late emarginatis, fere a basi angustatis, apice separatim rotundatis, dorso fasciis pluribus rufo-piceis transversis, extus penicillatis, intercallis deplumatis, griseo-squamosulis, humeris breviter penicillatis; propygidio lateribus rufo; pedibus validis, rufulo-squamosis, tibiis anticis quadridentatis, dentibus sat obtusis.*

Ce *Valgus* est remarquable par sa taille, sa coloration, les deux saillies dentiformes du devant du corselet. Il rappelle *V. fasciculatus*, du Cap, mais bien plus gros, et d'une coloration plus foncée et plus variée.

**Melibœus multicolor**, n. sp. — Long. 40 mill. — *Elongatus, postice attenuatus, senescenti-aureus, nitidas, elytris fusco-cærulescentibus, minus nitidis, sutura basi late, postice anguste aurea, medio, post medium et ante apicem fasciis albido-pubescentibus variegatis; capite fortiter sat dense punctato, medio sulcatulo, antennis serrulatis, aneo-aureis; prothorace brevi, elytris vix angustiore, antice a medio angustato, lateribus sat rotundato, dorso grosse sat dense punctato, rugosulo, basi utrinque fortiter emarginato, medio truncato; scutello lato, lœvi, transversim carinato, apice acuto; elytris elongatis, post medium attenuatis, apice truncatis et acute spinosulis, sat dense punctulatis, sutura postice leviter elevata; subtus nitidior, pedibus cyaneis, dense subtiliter punctatus, abdomine apice fortius punctato et utrinque vage cærulescente.*



La terminaison épineuse des élytres rappelle ce que l'on voit dans le genre *Mychommatus*, mais la vestiture et la coloration sont bien différentes.

**Nyctobates blapoides**, n. sp. — Long. 25 mill. — *Oblongus, postice paulo ampliatus, modice convexus, niger, subopacus, elytris vix nitidulis, subtus cum pedibus nitidus; capite sat brevi, subtiliter sat dense punctulato, sutura clypeali sat tenui sed distincta, labro nitidulo apice rufo-villoso, antennis brevibus, cum palpis piceis, prothoracis basin haud attingentibus, articulis 3<sup>o</sup> ultimis latioribus, 3<sup>o</sup> sequenti fere dimidio longiore; prothorace elytris paulo angustiore, longitudine duplo latiore, antice a medio sat fortiter angustato, dorso subtilissime dense punctato, lateribus et basi sat fortiter marginato, basi late bisinuato, angulis acutis, levissime divaricatis; scutello triangulari, vix punctulato, medio subsulcato; elytris amplis, ad humeros modice rotundatis, apice obtusis, dorso sat fortiter striatis, striis punctulatis, apice haud obsolescentibus, intervallis modice convexis, subtilissime vix perspicue punctulatis; subtus lateribus sat dense punctatus, segmentis abdominalibus basi dense strigosis, duobus ultimis levigatis, pedibus punctulatis, tibiis anticis rectis, tarsis subtus rufo-villosis.*

Remarquable par sa forme assez courte, son corselet très transversal et ses élytres amples, ce qui lui donne un peu l'aspect de certains Blaps. Il a une certaine ressemblance avec *N. Mechowi*, de la même région; mais ce dernier, outre sa coloration bleue, a le corselet bien moins large, moins rétréci en avant et les élytres dilatées en arrière.

**Selinus curtulus**, n. sp. — Long. 13 mill. — *Ovatus, postice ampliatus, parum convexus, postice paulo magis, fusco-niger, sat nitidus, subtus cum pedibus nitidior; capite brevi, subtilissime punctato, clypeo sinuato, antennis medium prothoracis paulo superantibus, apicem versus paulo crassioribus, articulo 3<sup>o</sup> sequenti parum longiore; prothorace brevi, longitudine duplo latiore, antice angustato, lateribus a basi rotundato, dorso subtilissime dense punctulato, impressiusculo, medio leviter bifoceolato, lateribus deplanato, margine postice medio recto, ante angulos obliquato, angulis sat acule retroversis; scutello truncato, fere laevi; elytris brevibus, postice dilatatis, apice obtuse rotundatis, dorso striolato-punctatis, striis vix impressis, sed sat fortiter punctatis, intervallis planis, dense sat subtiliter punctatis et obsolete transversim cicatricosis, subtus fere levis, prosterno apice planato et obtuse producto, abdomine basi obsolete punctato.*

Ressemble assez à *S. platessa* Fairm., mais plus élargi en arrière, à

corselet plus arrondi sur les côtés et légèrement rétréci vers la base et à élytres moins fortement striées-ponctuées.

**Prioscelides** Kolbe, Stett. ent. Zeit., 1889, 128.

Ce genre, assez voisin des *Prioscelis*, mais surtout des *Pycnocerus*, en diffère notablement par le faciès; le corps est moins convexe, le corselet est denticulé sur les côtés, les tarse sont spinuleux en dessous, tous les tibias sont denticulés en dedans, les antérieurs assez fortement arqués, les autres le sont plus faiblement vers l'extrémité, l'épistome est échancré en croissant, le labre est quadrangulaire, transversal, tronqué; les antennes sont assez épaisses, dépassant le milieu du corselet, ne grossissant pas vers l'extrémité, mais avec le dernier article plus gros, plus grand, en ovale très court. Les angles antérieurs du corselet sont très saillants, dentiformes.

*P. rugosus* Kolbe, loc. cit. — Long. 18 à 20 mill. — *Elongatus, modice convexus, fuscus, parum nitidus; capite prothoraceque dense fortiter punctato-rugosis; hoc longitudine haud latiore, elytris valde angustiore, antice et basi æqualiter angustato, lateribus parum rotundato, sat acute marginato, dorso parum convexo, disco longitudinaliter levissime impresso; scutello sat lato, triangulari-rotundato, dense punctato; elytris elongatis, subparallelis, ad humeros angulatis, apice rotundatis, dorso anguste costulatis, interstitiis sat latis, grosse crenato-punctatis, intervallo suturali haud elevato, fortiter punctato; subtus nitidior, pectore cum pedibus fortiter punctato, abdomine fortiter punctato. segmentis apice levibus et transversim convexis; ♂ femoribus crassioribus, anticis subtus medio breviter dentatis, posterioribus apice subtus dente lato armatis, tibiis omnibus acute denticulatis.*

*Lagria subcostulata*, n. sp. — Long. 12 à 17 mill. — *Oblongorata, postice leviter ampliata, modice convexa, testaceo-rufa, modice nitida, griseo-villosula, elytris parum obscure brunneo-piceolis, vage violascentibus, interdum apice rufescentibus; capite brevi, dense punctulato, inter antennas transversim sulcato, inter oculos puncto levi, nitido signato, antennis sat brevibus, ♂ medium corporis haud attingentibus, articulo ultimo 4 præcedentibus conjunctis fere æquali, ♀ tertiam corporis partem haud superantibus, articulo ultimo 2 præcedentibus conjunctis haud longiore; prothorace transverso, brevi, lateribus sat rotundato, densissime sat subtiliter punctato, medio obsolete, basi eidentius anguste elevato; scutello triangulari, apice obtuso, punctulato; elytris implis, postice leviter ampliatis, apice angustato-obtusis, ad humeros*

*parum fortiter rotundatis, dorso densissime punctulatis et transversim subtiliter strigosulis, costulis parum elevatis, alternatim paulo magis convexis; subtus subtiliter dense punctata, metapleuris fortius punctatis, pedibus obscurioribus.*

Ressemble extrêmement à *L. obesa* Th., de la même région, mais en diffère, outre la coloration constante, par les élytres plus amples, à côtes légères, mais bien distinctes, alternativement plus marquées, les antennes plus courtes, plus épaisses, le dernier article plus long chez le mâle, les yeux sont un peu moins gros, le corselet est aussi caréné chez la femelle et non chez le mâle.

**ELETICA COLORATA** Har. — Je crois devoir rapporter à cette espèce un individu atteignant 30 mill., et dont la coloration est un peu différente sur les élytres qui présentent à la base trois taches noires : deux humérales, l'autre plus grande, couvrant l'écusson et la région scutellaire.

**Tragocephala fuscovelutina**, n. sp. — Long. 16 mill. — *Oblonga, supra fusco-velutina, macula frontali et utrinque macula post-oculari, elytris utrinque maculis 4 minutis, 1<sup>a</sup> basali, 2<sup>a</sup> subhumerali, 3<sup>a</sup> mediana, 4<sup>a</sup> anteapicali flavis, prothorace utrinque vitta marginati antice flava, postice albida; subtus cum pedibus nigra, nitida, pectore dense pallido-cærulescente pubescente, abdomine utrinque transversim pubescente, pedibus similiter pubescentibus, trochanteribus, femoribus medio et tibiis apice denudatis, nigris; capite inter oculos plumato, antennis sat gracilibus, corpore paulo longioribus, fusco-violuscentibus, opacis, articulis apice extremo politis, 3<sup>o</sup> segmenti longiore; prothorace parum transverso, elytris paulo angustiore, lateribus medio ungulatis, dorso ante basin transversim sulcatulo, basi utrinque ante angulos sat fortiter sinuato, parte media quasi late lobata; scutello minuto, triangulari; elytris lævibus, apice angustatis; subtus lævis, pedibus brevibus.*

Cet Insecte est remarquable par sa petite taille et sa coloration, le dessus du corps étant couvert d'un velours noir, mat, très faiblement violacé, avec de petites taches jaunes; le dessous, au contraire, brillant, avec la poitrine et les côtés de l'abdomen couverts d'une pubescence serrée d'un bleuâtre pâle.

**Hyperacantha flavodorsata**, n. sp. — Long. 6 à 7 1/2 mill. — *Orata, postice ampliata, rufescenti-flava, nitida, elytris atro-cæruleis, plaga transversa mediana communi pallide flava, marginem externum haud attingente, interdum interrupta, margine apicali anguste flavo, tibiis (basi excepta) tarsisque infuscatis; capite lævi, fronte transversim*

*profunde sulcata, antennis gracilibus, apice vix infuscatis, articulo 3<sup>o</sup> sequenti vix sensim longiore; prothorace brevi, lateribus antice rotundato, dorso transversim impresso, lateribus fortius, angulis posticis valde obtusis; elytris ad humeros sat angulatis, lateribus ante medium postice ampliatis et modice marginatis, dense subtilissime punctulatis, ante medium ad suturam leviter transversim impressis. ♂ postice magis ampliatis et ante apicem ad suturam paulo tuberoso-plicatis; abdomine sat dense punctato.*

Ressemble à *Diacantha interrupta* Karsch, mais la bande dorsale des élytres est moins large, non prolongée en avant sur la suture, d'une coloration plus pâle que celle du corps, la ponctuation des élytres n'est nullement substriée et leur extrémité est étroitement bordée de jaune pâle.

**Hyperacantha pectoralis**, n. sp. — Long. 7 mill. — *Ovata, postice ampliata, flava, nitida, elytris, mesosterno pedibusque nigris; capite lævi, fronte supra oculos transversim sulcato, antennis gracilibus, apice obscuratis, articulo 3<sup>o</sup> sequenti vix sensim longiore; prothorace transverso, lateribus medio obtuse angulato, medio transversim profunde sulcato, angulis posticis obtusis; scutello piceolo; elytris ad humeros angulatim rotundatis, ante medium postice dilatatis et marginatis, dorso subtilissime punctulatis, ante medium ad suturam leviter transversim impressis, lateribus pone humeros oblonge impressis; abdomine dense subtiliter punctato, metasterno interdum piceo tibiis cinereo-pubescentibus; ♀.*

Ressemble beaucoup à *H. melanoptera* Th., en diffère par la coloration du dessous du corps, des pattes et des antennes.

**Monolepta atomaria**, n. sp. — Long. 7 mill. — *Ovata, convexa, flava, elytris punctis numerosis nigris, sæpius minutissimis ornatis, metasterno interdum castaneo, abdomine obscuriore, pubescente, tibiis apice extremo interdum fusco, labro nigro; capite lævi, inter oculos transversim leviter sulcato, antennis gracilibus, medium corporis superantibus, articulis ultimis apice infuscatis, ultimo acuto, 3<sup>o</sup> sequenti multo brevior; prothorace brevi, antice angustato, lateribus et basi sat tenuiter marginato, angulis posticis sat obtusis; elytris amplis, apice rotundatis, subtilissime dense punctulatis; metasterno medio fortiter sulcato.*

Les taches des élytres sont au nombre de quinze à vingt sur chaque élytre et en forme de points souvent très petits, disposés peu régulièrement.